腸病毒防治查核重點

機構別	重點事項
教托育機構	1.洗手環境與行為 (1)是否於洗手台放置適當數量之洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙 (2)是否衛教學童瞭解正確洗手步驟 (3)學童洗手動作是否正確 (4)學童是否認知正確洗手時機 2.環境清消 (1)是否能正確配製500ppm漂白水 (2)是否定期環境清潔及重點消毒[註] (3)是否製作清消紀錄 3.防疫機制 (1)是否建立學童健康監視記錄 (2)是否確實瞭解縣市之腸病毒疫情與停課通報機制並依循運作 (3)是否知道如何查詢宣導資料 (4)是否張貼宣導資料 (5)是否實施家長衛教
嬰幼兒及學童常出入之公共場所（如遊樂區、百貨賣場、餐廳等）	1.洗手環境 (1)是否於洗手台放置適當數量之洗手乳或肥皂、擦手紙 (2)是否張貼正確洗手步驟宣導資料 2.環境清消 (1)是否能正確選用消毒劑[註]，請宣導正確配製500ppm漂白水方法 (2)是否針對遊戲區、電梯、手扶梯、手推車、洗手間實施定期（時）消毒 (3)是否製作消毒紀錄
醫療機構	1.洗手環境 (1)是否於洗手台放置洗手乳或肥皂、擦手紙 (2)是否張貼正確洗手步驟宣導資料 2.環境清消 (1)是否能正確配製500ppm漂白水 (2)是否針對遊戲區、電梯、手扶梯、洗手間實施定期（時）消毒[註] 3.衛教宣導 (1)是否張貼腸病毒宣導海報或資料 (2)醫師是否對腸病毒病童家長進行重症前兆病徵衛教 4.疑似重症個案處置機制 (1)是否提供醫護人員相關宣導訊息（如轉知本署相關公文、新聞稿、致醫界通函等） (2)是否明確建立轉診機制且相關醫護人員皆明瞭 (3)若為腸病毒重症責任醫院，聯繫窗口是否隨時保持暢通
居家	衛教宣導 (1)照顧者是否知道正確洗手步驟及時機 (2)照顧者是否知道「生病不上學」之防疫概念 (3)是否知道漂白水為最簡單有效之消毒方法，並宣導正確配製500ppm漂白水方法 (4)照顧者是否知道4項重症前兆病徵:「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等 (5)是否知道出現重症前兆病徵時，應立即送大醫院，可掌握治療的黃金時間

註：使用500ppm漂白水或其他具檢驗報告可證實對腸病毒有效之消毒藥品。