

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (3) 人體內最小的細胞是①肝細胞②卵細胞③紅血球④白血球。
2. (2) 修剪側頭部頭髮的髮片拉到耳後剪的結果是①前短後長②前長後短③中心較短④等長。
3. (2) 洗髮時至少要打①一次②二次③三次④四次 泡沫。
4. (1) 沖水時應將蓮蓬頭拉①低②高③上④一樣 於頭的部位，再打開水龍頭。
5. (1) 從業人員的服務態度應該是①和藹可親②隨隨便便③馬馬虎虎④嚴肅。
6. (1) 上電熱捲前應先將頭髮①完全吹乾②吹 7~8 分乾③吹半乾④噴濕。
7. (2) 若染劑沾上手指或皮膚時可用①酒精②氨水③丙酮④熱水 擦掉。
8. (3) 染髮①3 天後②5 天後③7 天後④馬上 方可進行冷燙。
9. (2) 美髮師工作姿勢正確，較①客人安心②不容易疲勞③髮型好④材料省。
10. (1) 使用氯液消毒法，機具須完全浸泡至少多少時間以上①二分鐘②五分鐘③十分鐘④二十分鐘。
11. (1) 化粧品中禁止使用氯氟碳化物(Freon)，係因它在大氣層中會消耗①臭氧②氧氣③二氧化碳④一氧化碳 使得皮膚受到紫外線的傷害。
12. (3) 雙手最容易帶菌，從業人員要經常洗手，尤其是①工作前，大小便後②工作前，大小便前③工作前後，大小便後④工作後，大小便後。
13. (1) 下列中非頭髮護理的方法是①洗髮②塗抹保養油③拍打頭髮使髮油易滲入④蒸氣加溫。
14. (1) 天天洗髮或吹髮，長久會造成頭髮①失去光澤②易梳③髮量增多④易穩定。
15. (3) 冷燙時塗藥程序及方法可依①髮色與髮質②髮色與髮長③髮質與髮長④髮量與髮色 而設定。
16. (1) 髮幹構造由裡到外共有那幾層①髓質層、皮質層、表皮層②髓質層、皮質層③髓質層、皮質層、表皮層、外表皮層④表皮層、髓質層。
17. (4) 下列情況何者最為急迫①休克②大腿骨折③肘骨骨折④大動脈出血。
18. (4) 化粧品包裝上可無須刊載的有①品名②廠名③廠址④規格。
19. (2) 冷燙劑至少應該有①一劑②二劑③三劑④四劑 才能完成燙髮。
20. (2) 頭部 15 點中的 G.P 就是①頂點②黃金點③中心點④耳點。
21. (4) 美髮化粧品應存放於①日光照射處②潮濕處③陰暗處④陰涼通風處。
22. (1) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為①0.1~0.5%②0.5~1%③1~3%④3~6% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。
23. (4) 吹風時較不適合當輔助梳使用的是①小板梳②刮梳③尖尾梳④菜刀梳。
24. (1) 沒有起毛肌的毛髮是①眉毛②頭髮③手部的毛髮④腳部的毛髮。
25. (2) 頭部七條基準線中，側頭線是①較耳點稍高的水平線②前側點至側中線③左側點至右頸側點④耳點至頸側點。
26. (2) 肌肉的中央部分膨大，而二端漸細，其中央部分稱為①肌頭②肌腹③肌腱④肌尾。
27. (1) 生髮水係屬①藥品②含藥化粧品③一般化粧品④日用品。
28. (2) 頭髮成長不受那一項影響①季節②味覺③荷爾蒙④健康。
29. (3) 細菌可經由下列何者進入體內①乾燥的皮膚②濕潤的皮膚③外傷的皮膚④油質皮膚。
30. (4) 剪髮後適合清理顧客臉上或頸上髮屑用的是①S 彎梳②圓梳③小板梳④長毛刷。
31. (4) 一般冷燙劑 pH 值不可超過①7.5②8③9④9.5。
32. (3) 半永久性染髮劑可以進入頭髮皮質層，但未與什麼結合①人工色②氧化素③色素粒子④活性劑。

33. (3) 剪髮時，同等區域的頭髮為維持同一長度宜①縱持髮②斜持髮③水平持髮④不用持髮。
34. (1) 營業場所內有顧客大傷口受傷應①給予緊急處理後協助送醫②立刻請他離開③報警④簡單處理後隨便他。
35. (1) 金屬製品的剪刀、剃刀、剪髮機等，切忌浸泡於①氫液②熱水③酒精④複方煤鹼油酚肥皂液中，以免刀鋒變鈍。
36. (4) 冷捲時髮尾未捲緊，易造成①過捲②不影響③適中④不捲。
37. (4) 經常梳理頭髮對血液循環有助益，也可使毛髮①易斷裂②易分叉③增加髮量④促進生長。
38. (3) 應用手和髮夾捲出來的捲法是①髮筒捲法②指推波紋③螺蛳④電鉗捲法。
39. (2) 下列中可消除陰離子所產生靜電的是①洗髮精②護髮油③燙髮劑④殺菌劑。
40. (2) 整髮時夾捲的圓環依序重疊①1/2②1/3③1/4④1/5。
41. (4) 顏色的二等色不包括①橙②紫③綠④紅。
42. (3) 病原體進入人體後並不顯現病症，仍可傳染給別人使其生病這種人稱①病媒②病原體③帶原者④中間寄主。
43. (2) 理燙髮美容業者應備有完整的①工具箱②急救箱③意見箱④小費箱 以便發生意外時，隨時可運用。
44. (1) 使用不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能感染下列何種傳染病①砂眼②狂犬病③日本腦炎④登革熱。
45. (1) 判斷捲髮的波浪效果是①S型②直線型③三角型④多角型。
46. (2) 防止砂眼的傳染應注意①空氣流通②毛巾器械之消毒③光線充足④食物煮熟。
47. (2) 頭髮露出表皮可見的部分稱為①髮根②髮幹③髮骨④毛囊。
48. (1) 為增加室內房間的明亮度，牆壁顏色宜採①淡色②深色③中間色④灰色。
49. (2) 剪無層次髮型時食指指端撐著剪刀的支軸，可促使①速度加快②控制良好③視線清晰④辨別引導線。
50. (4) 下列各項中不會造成燙髮不捲的原因是①髮質②燙髮藥劑③燙髮技術④價格。
51. (3) 肌肉疲勞是①鹽酸②磷酸③乳酸④脂肪酸 儲存的結果。
52. (2) 對腐蝕性化學品中毒的急救是①給喝蛋白或牛奶後催吐②給喝水或牛奶但勿催吐，立刻送醫③給予腹部壓擠④給予胸外按壓。
53. (3) 燙髮捲度之強弱與那一項無關①捲子大小②時間長短③捲燙姿勢④藥水強弱。
54. (1) 燙髮時頭髮保持 pH 值的陰、陽離子應①相等②不相等③相斥④不結合 才最適合。
55. (3) 人體最大面積的器官是①心臟②肺③皮膚④肚子。
56. (2) 冷燙時氧化劑的用量必需與還原劑的用量①多②相等③少④不必用。
57. (2) 染髮後宜選用①強酸性②弱酸性③強鹼性④弱鹼性 洗髮精。
58. (4) 毛髮完全脫離毛乳頭是屬於①生長期②活躍期③退化期④休止期。
59. (2) 染劑或任何藥劑的保存方法①放置高溫處②放置陰涼處③日光可照射得到④不須考慮。
60. (1) ①前頭部②內部③後頭部④頸背部 的毛髮，易受外界影響而受損。
61. (2) 理燙髮從業人員工作時為預防傳染病發生，下列敘述何者正確①吃維他命②戴口罩③吃抗生素④吃豬血。
62. (4) 皮膚試驗可知道①顯現時間②髮色搭配③髮質優劣④過敏現象。
63. (3) 捲曲型頭髮在顯微鏡下觀察外形幾乎是①圓形②橢圓形③扁平形④三角形。
64. (1) 梳頭髮用的髮梳，其質料最好採用①鬃毛梳②鐵梳③鋁製品梳子④膠類製品 來梳髮。
65. (4) 水平剪髮時，髮束與剪刀應成①45度②60度③75度④90度。
66. (2) 對輕微灼燙傷的處理為①塗敷清涼劑②用冷水沖至不痛③刺破水泡④塗醬油或牙膏。
67. (1) 毛髮上色素粒子在①皮質層②髓質層③毛表皮層④毛根。

68. (4) 聞到濃瓦斯味時應開①電風扇②排油煙機③抽風機④門窗。
69. (4) ①增加體積②增加蓬鬆③創造焦點④破壞髮質 並不是燙捲頭髮的目的。
70. (1) 髮油的原料①植物油、礦物油、動物油②植物油、沙拉油、動物油③乳質油、植物油、動物油④汽油、植物油、礦物油。
71. (1) 紫外線消毒法為一種①物理消毒法②化學消毒法③超音波消毒法④核能消毒法。
72. (2) 患有嚴重頭皮疾病的顧客①要②拒絕③可以④不一定 為其做美髮服務。
73. (1) 設計師對本身儀容、態度應加以重視，更重要的是對待顧客時儘量強調對方①優點②缺點③流行④髮色。
74. (2) 洗髮時間太短會讓客人覺得馬虎，時間太長又招致客人疲勞厭煩，且傷害髮質，所以洗髮的時間以①3~5②10~15③25~30④30~40 分鐘為最適宜。
75. (2) 頭髮本身所帶的電荷為①陽離子②陰離子③正負都有④正負都沒。
76. (3) 燙髮後，使用染髮劑應隔幾天進行①1天②3天③7天④無限制。
77. (1) 液態乾性洗髮劑是從①石油或苯②乙醇系③油脂④氨水中 提煉而成。
78. (3) 燙髮作用過度時會產生①有波浪的頭髮②捲捲頭③脆弱分叉的頭髮④柔軟的頭髮。
79. (1) 淺波紋這名詞是指①平捲②立捲③抬高④空心捲 法。
80. (3) 傳遞由腦部發出的訊息，控制並協調各器官的功能是①循環②肌肉③神經④消化。